



ScienceDirect

journal homepage: www.elsevier.com/locate/crvasa



Erratum | Corrigendum

Erratum k: „TAVI – od výběru pacientů až po další sledování jejich zdravotního stavu“

[Cor Vasa 59 (2017) e2–e9]

(Corrigendum to “TAVI – From patient selection to follow-up” [Cor Vasa 59 (2017) e2–e9])

Michael Želízko

Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Na str. 12 by druhá věta třetího odstavce měla znít takto:

Vyšetření cév se nejčastěji provádí kontrastní angiografií nebo metodou MDCT s použitím poměru SFAR (outer Sheath diameter to Femoral Artery minimal lu-

minal diameter Ratio) $\leq 1,10$ u nekalcifikovaných cév a $\leq 1,00$ v přítomnosti středně závažné až závažné kalcifikace.

Adresa: MUDr. Michael Želízko, CSc., Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4, e-mail: mize@ikem.cz
© 2017, ČKS. Published by Elsevier sp. z o.o. All rights reserved.

DOI: 10.1016/j.crvasa.2017.03.010